DUBBA

MAARİF UYUMLU YAPRAK TEST

Nicelikler ve Değişimler

10. Sınıf Matematik · 4. Tema · Yaprak Test 1


Adı Soyadı _____

Sınıfı / No _____

Sayfada çöz, anında kontrol et

Bu testte **12 soru** vardır (4 kolay, 4 orta, 4 zor). Önerilen süre **30 dakikadır**.
Cevaplarınızı testin sonundaki cevap formuna işaretleyiniz.
Cevap anahtarı ve adım adım çözümler **dubba.com.tr** üyelerine ücretsizdir; son sayfadaki karekodu okutunuz.

1. Okul bahçesindeki meteoroloji istasyonunda, saat 16.00'dan itibaren 8 saat boyunca hava sıcaklığının değişimi incelenmiştir. Sıcaklık, saat 16.00'dan sonra geçen süre x (saat) olmak üzere $f : [0, 8] \to \mathbb{R}$, $f(x) = -x + 20$ cebirsel kuralıyla modellenmiştir. Aynı verinin grafik temsilinde yatay eksen x, düşey eksen sıcaklık (°C) olup grafik, $(0, 20)$ ile $(8, 12)$ noktalarını birleştiren doğru parçasıdır.



Buna göre cebirsel temsil ile grafik temsilinin karşılaştırılmasına dayalı olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Cebirsel temsil ile grafik uyumludur; f, $[0, 8]$ aralığında artan ancak bire bir değildir.

B) Cebirsel temsil ile grafik uyumlu değildir; f, $[0, 8]$ aralığında azalan ve bire birdir.

C) Cebirsel temsil ile grafik uyumludur; f çift fonksiyondur ve $[0, 8]$ aralığında artandır.

D) Cebirsel temsil ile grafik uyumlu değildir; f sabit fonksiyondur ve bire bir değildir.

E) Cebirsel temsil ile grafik uyumludur; f, $[0, 8]$ aralığında azalan ve bire birdir.

2. Beslenme ve sağlık dersindeki bir proje grubu, günlük meyve tüketimi ile C vitamini göstergesi arasındaki ilişkiyi modelliyor. Günlük meyve tüketimi x porsiyon iken C vitamini göstergesi $g(x) = \sqrt{x - 2}$ fonksiyonuyla ifade ediliyor. Bir öğrenci, karekök referans fonksiyonu $f(x) = \sqrt{x}$ $(x \geq 0)$ fonksiyonunun tanım kümesinin $[0, \infty)$ olmasından hareketle şu genellemeyi yazıyor: "g fonksiyonunun tanım kümesi de $[0, \infty)$ olur."

Bu genellemenin varsayımı karşılayıp karşılamadığı kontrol edildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

A) Karşılar; karekök ifadesi her gerçek sayıda tanımlı olduğundan tanım kümesi $[0, \infty)$ kalır.

B) Karşılar; ifadenin içindeki çıkarma yalnızca grafiği kaydırır, tanım kümesi $[0, \infty)$ kalır.

C) Karşılamaz; karekökün tanımlı olması için $x \geq 2$ olmalı, tanım kümesi $[2, \infty)$ olur.

D) Karşılamaz; karekökün tanımlı olması için $x \leq 2$ olmalı, tanım kümesi $[0, 2]$ olur.

E) Karşılamaz; $x = 2$ için fonksiyon tanımsız olduğundan tanım kümesi $(2, \infty)$ olur.

3. Deprem haftasında bir okulun afet bilinci kulübü, depodaki 60 litrelik içme suyunun kaç gün yeteceğini günlük tüketime göre incelemiştir. Günlük tüketim x litre, suyun yettiği süre $g(x)$ gün olmak üzere kulübün tablosu aşağıdadır. Değerler, $f(x) = \dfrac{1}{x}$ $(x \neq 0)$ rasyonel referans fonksiyonundan türetilen $g(x) = 60 \cdot f(x) = \dfrac{60}{x}$ $(x > 0)$ modeli ile uyumludur.

Günlük tüketim x (litre)	**2**	**4**	**6**	**8**
Süre $g(x)$ (gün)	30	15	10	7,5

Bir öğrenci, tüketim 2 litreden 4 litreye çıkınca sürenin 30 günden 15 güne indiğini görerek şu genellemeyi yapmıştır: "Günlük tüketim her 2 litre artırıldığında suyun yettiği süre her zaman 15 gün azalır."

© 2026 Dubba · Tüm hakları saklıdır · dubba.com.tr/telif

Bu genellemeye yönelik aşağıdaki kontrollerden hangisi doğrudur?

A) Tüketim 2 litreden 4 litreye çıkınca süre 30 günden 15 güne iner. Azalma 15 gün olduğu için genelleme varsayımları karşılar.

B) Tüketim 6 litreden 8 litreye çıkınca süre 10 günden 7,5 güne iner. Süre yine azaldığı için genelleme varsayımları karşılar.

C) Tüketim 2 litreden 6 litreye çıkınca süre 30 günden 10 güne iner. Azalma 20 gün olduğu için genelleme varsayımları karşılar.

D) Tüketim 4 litreden 6 litreye çıkınca süre 15 günden 10 güne iner. Azalma 5 gün olduğu için genelleme varsayımları karşılamaz.

E) Tüketim 6 litreden 8 litreye çıkınca süre 10 günden 7,5 güne iner. Azalma 15 gün olduğu için genelleme varsayımları karşılamaz.

4. Bir okul kermesinde satılan kurabiye paketlerinin günlük geliri (TL), satılan paket sayısı x olmak üzere $f(x) = x^2$ karesel fonksiyonu ile; günlük maliyeti (TL) ise $g(x) = 8x$ doğrusal fonksiyonu ile modellenmiştir.

Günlük gelirin günlük maliyete eşit ya da ondan büyük olduğu duruma karşılık gelen cebirsel ifade ve bu ifadenin grafik üzerindeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $f(x) = g(x)$ denklemidir; parabol ile doğrunun kesiştiği noktalara ait x değerleridir.


B) $f(x) \geq g(x)$ eşitsizliğidir; kesişim noktaları dahil parabolün doğrunun üstünde kaldığı x değerleridir.

C) $f(x) \leq g(x)$ eşitsizliğidir; kesişim noktaları dahil parabolün doğrunun altında kaldığı x değerleridir.

D) $f(x) \geq 0$ eşitsizliğidir; kesişim noktaları dahil parabolün x ekseninin üstünde kaldığı x değerleridir.

E) $f(x) > g(x)$ eşitsizliğidir; kesişim noktaları hariç parabolün doğrunun üstünde kaldığı x değerleridir.

5. Okul kütüphanesi öğleden sonra 5 saat açık kalmaktadır. Açılıştan itibaren geçen süre x saat olmak üzere salondaki öğrenci sayısını kütüphane görevlisi $f(x) = 4x + 2$, $0 \leq x \leq 5$ cebirsel temsiliyle modellemiştir. Kapıdaki sayaç ise aynı zaman aralığında salondaki öğrenci sayısını aşağıdaki grafikle kaydetmiştir. Grafikte yatay eksen süreyi (saat), düşey eksen öğrenci sayısını gösterir.



Buna göre cebirsel temsil ile grafik temsil, fonksiyon olma şartları ve nitel özellikler bakımından karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her iki temsil de fonksiyon belirtir; ancak $[3, 5]$ aralığında cebirsel temsil sabit, grafik temsil artandır.

B) Grafik temsil düşey doğru testini sağlamadığından fonksiyon değildir; cebirsel temsil ise bire birdir.

C) İki temsil de bire bir fonksiyondur ve görüntü kümelerinin ikisi de $[2, 22]$ aralığıdır.

D) Cebirsel temsilin maksimum değeri 14, grafik temsilin maksimum değeri ise 22 dir.

E) İki temsil de fonksiyondur; cebirsel temsil bire bir, grafik temsil ise bire bir değildir.

6. Okul bilim şenliğinde Celsius sıcaklığını M birimine dönüştüren fonksiyon $f(x) = \frac{5}{2}x - 10$ olarak veriliyor. Kontrol ölçümlerinde 0 °C değeri -10 M, 10 °C değeri 15 M bulunuyor. f gerçek sayılarda bire bir ve örten bir fonksiyondur. Grup, bu fonksiyonun tersine ilişkin önermeler yazıyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, f fonksiyonunun tersine ilişkin matematiksel olarak doğrulanabilecek önermedir?

A) $f^{-1}(x) = \dfrac{1}{\frac{5}{2}x - 10}$ biçimindedir.

B) $f^{-1}(x) = \frac{5}{2}x + 10$ biçimindedir.

C) $f^{-1}(x) = \frac{2}{5}x - 4$ biçimindedir.

D) $f^{-1}(x) = \frac{2}{5}x + 4$ biçimindedir.

E) $f^{-1}(x) = \frac{2}{5}x + 10$ biçimindedir.

7. Bir çini atölyesinde lale motifinin eni x cm, boyu ise karesel referans fonksiyondan türetilen $f(x) = (x - 4)^2 + 1$ $(x \geq 4)$ fonksiyonuyla, santimetre cinsinden belirlenmektedir. Motife ait bazı ölçümler aşağıdaki tablodadır.

© 2026 Dubba · Tüm hakları saklıdır · dubba.com.tr/telif

En x (cm)	Boy $f(x)$ (cm)
4	1
5	2
6	5

Deniz'in varsayımı: "Bu fonksiyon karesel referans fonksiyondan türetildiği için değişkenler yer değiştirince oluşan ilişki, tanım kümesi kısıtlanmasa da bir fonksiyon belirtir ve $f^{-1}(x)=\dfrac{1}{f(x)}$ olur."

Ece'nin genellemesi: "Karesel referans fonksiyondan türetilen bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olması için tanım kümesi, fonksiyon bire bir ve örten olacak şekilde kısıtlanmalıdır. Bu durumda tersin grafiği, fonksiyonun grafiğinin $y=x$ doğrusuna göre simetriğidir. Bu motif için $f^{-1}(x)=\sqrt{x-1}+4$ ve tanım kümesi $x\geq 1$ olur."

Deniz'in varsayımı ile Ece'nin genellemesi karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Varsayım geçersizdir, genelleme geçerlidir; $f^{-1}(x)=\sqrt{x-1}+4$ $(x\geq 1)$ doğrudur.

B) Varsayım geçerlidir, genelleme geçersizdir; kısıtsız ilişkide de ters $f^{-1}(x)=\sqrt{x-1}+4$ olur.

C) Varsayım geçerlidir, genelleme geçersizdir; ters $f^{-1}(x)=\dfrac{1}{(x-4)^2+1}$ olur.

D) Varsayım da genelleme de geçerlidir; ters $f^{-1}(x)=\sqrt{x-1}+4$ $(x\geq 1)$ olur.

E) Varsayım da genelleme de geçersizdir; ters $f^{-1}(x)=4-\sqrt{x-1}$ $(x\geq 1)$ olur.

8. Bir okul laboratuvarında pistonlu kapta tutulan bir gazın basıncı, litre cinsinden hacim $V>0$ olmak üzere $P(V)=\dfrac{48}{V}$ fonksiyonuyla modellenmektedir. $P(V)$ basıncı kilopaskal cinsinden gösterir. Gazın güvenli çalışması için basıncın en az 6 kPa ve en çok 16 kPa olması gerekir. Bu koşul $V>0$ için çözülerek $3\leq V\leq 8$ eşitsizliğine dönüştürülmüştür.

$3\leq V\leq 8$ eşitsizliğinin problem bağlamındaki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenli çalışma, hacim 3 L'den 8 L'ye artarken basıncın 16 kPa'dan 6 kPa'ya düşmesine karşılık gelir.

B) Güvenli çalışma, hacim 3 L'den 8 L'ye artarken basıncın 6 kPa'dan 16 kPa'ya yükselmesine karşılık gelir.

C) Güvenli çalışma, basınç 3 kPa'dan 8 kPa'ya artarken hacmin 16 L'den 6 L'ye düşmesine karşılık gelir.

D) Güvenli çalışma, hacim 6 L'den 16 L'ye artarken basıncın 8 kPa'dan 3 kPa'ya düşmesine karşılık gelir.

E) Güvenli çalışma, hacim 3 L'den 8 L'ye artarken basıncın 48 kPa değerinde sabit kalmasına karşılık gelir.

9. Bir okul kantininde bir sandviç 10 TL'ye satılmakta ve günde 40 adet satılmaktadır. Fiyata yapılan zam x TL (x gerçel sayı) olduğunda günlük satışın $2x$ adet azaldığı bir model kullanılmaktadır. Kantin $0\leq x\leq 10$ aralığını incelemekte ve günlük geliri $G(x)=(10+x)(40-2x)$ fonksiyonu ile modellemektedir. $f(x)=x^2$ karesel referans fonksiyon olmak üzere kantin görevlisi şu önermeyi kurmuştur: Bu aralıkta gelirin en küçük değeri 400 TL'dir; en büyük değeri ise $x=5$ iken 450 TL'dir.

Bu önermeyle ilgili gerekçesiyle birlikte doğru olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önerme doğrudur; çünkü $G(0)=400$, $G(5)=450$ ve $G(10)=400$ bulunması, gelirin aralıktaki her x için bu iki değer arasında kaldığını tek başına kanıtlar.

B) Önerme doğrudur; çünkü bu aralıkta $G(x)=-2\cdot f(x-5)+450$ ve $0\leq f(x-5)\leq 25$ olup en büyük değer 450, en küçük değer $450-2\cdot 25=400$ olur.

C) Önerme yanlıştır; çünkü $G(x)=-2\cdot f(x+5)+450$ biçimindedir, tepe noktası $x=-5$ olduğundan $[0,10]$ aralığında en büyük gelir 400 TL olur.

D) Önerme yanlıştır; çünkü $0\leq x\leq 10$ iken $f(x-5)$ yalnızca 25 değerini alır, gelir sabit 400 TL kalır ve 450 TL'ye hiç çıkmaz.

E) Önerme yanlıştır; çünkü $f(x-5)\leq 25$ iken alt sınır $450-25=425$ bulunur, gelir 400 TL olamaz ve en küçük değer hatalıdır.

10. Bilim fuarında su roketi projesini hazırlayan Ece, iki atışın yerden yüksekliğini metre, süreyi saniye cinsinden modellemiştir. Modeller, $f(x)=x^2$ karesel referans fonksiyonundan $g(t)=a\cdot f(t\pm r)\pm k$ dönüşümüyle elde edilmiştir.

© 2026 Dubba · Tüm hakları saklıdır · dubba.com.tr/telif

Atış	Yükseklik fonksiyonu	Zaman aralığı	Ece'nin iddiası
Birinci	$h(t) = -(t-4)^2 + 25$	$0 \le t \le 8$	En büyük yükseklik 25 metredir.
İkinci	$p(t) = -(t-1)^2 + 40$	$4 \le t \le 7$	En büyük yükseklik 40 metredir.

İkinci atışta ölçüm yalnızca tablodaki zaman aralığında yapılmıştır. Ece, iddiaları doğrulamak için iki yöntem önermiştir.

Yöntem P: Her gerçek u için $u^2 \ge 0$ olduğunu kullanarak, verilen aralıktaki en büyük yüksekliğin tepe noktasının yüksekliği olduğunu göstermeye çalışmak.

Yöntem Q: Verilen aralığın yalnızca uç noktalarındaki yükseklikleri hesaplayıp bunların büyüğünü en büyük yükseklik kabul etmek.

Buna göre Yöntem P ve Yöntem Q'nun bu iki atıştaki kullanışlılığına ilişkin aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

A) Yöntem P her iki atışta da kullanışlıdır; en büyük değer daima tepe noktasında alınır. Yöntem Q hiçbir atışta kullanışlı değildir; uç değerler en büyük yüksekliği vermez.

B) Yöntem Q her iki atışta da kullanışlıdır; en büyük değer yalnızca aralığın uçlarında oluşur. Yöntem P hiçbir atışta kullanışlı değildir; tepe noktası bu değeri belirlemez.

C) Yöntem P yalnızca birinci atışta, Yöntem Q yalnızca ikinci atışta kullanışlıdır. Birincide tepe içeridedir; ikincide tepe dışarıdadır ve en büyük değer sol uçtadır.

D) Yöntem P yalnızca ikinci atışta, Yöntem Q yalnızca birinci atışta kullanışlıdır. İkinci atışta yükseklik 40 metreyi aşmaz; birinci atışta en büyük değer uçlardaki 9 metredir.

E) Her iki yöntem de her iki atışta kullanışlıdır; çünkü ikisi de aynı en büyük değeri verir. Birinci atışta bu değer 25 metre, ikinci atışta ise 40 metredir.

11. Okulun dijital fotoğraf kulübü, filtre uygulanan fotoğrafların dosya boyutunu inceliyor. Düzenlenmemiş bir fotoğrafta piksel yoğunluğu $t \ge 0$ olmak üzere dosya boyutu $f(t) = \sqrt{t}$ megabayt ile modelleniyor. Filtre, sadeleştirme düzeyini en az 5 birim olacak biçimde uyguluyor. Sadeleştirme düzeyi x birim olan bir fotoğrafın dosya boyutu $g(x) = -2f(x-5) + 8 = -2\sqrt{x-5} + 8$ megabayt oluyor. Yazılım, dosya boyutunu 0 megabayt veya daha küçük hesapladığında kaydı durduruyor ve yalnızca dosya boyutu pozitif olan fotoğrafları kulüp arşivine alıyor.

Arşive alınan fotoğraflar için kurulan önermeler cebirsel olarak inceleniyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi cebirsel olarak ispatlanabilir?

A) g fonksiyonunun tanım kümesi, karekök referans fonksiyonda olduğu gibi $[0, \infty)$ dır ve g bu kümede artandır. Arşive alınan dosya boyutlarının kümesi de $[0, \infty)$ olur.

B) $g(x) = 0$ denkleminin tek çözümü $x = 16$ dır. Arşive alınan sadeleştirme düzeyleri $5 \le x \le 16$ aralığındadır ve bu düzeylerde dosya boyutu $[0, 8]$ olur.

C) g fonksiyonu tektir; tanım kümesindeki her x için $g(-x) = -g(x)$ eşitliği sağlanır. $a = -2 < 0$ olması, g nin tekliğini cebirsel olarak garanti eder.

D) g, $[5, \infty)$ üzerinde azalandır. Arşiv koşulu $5 \le x < 21$ iken sağlanır ve dosya boyutu $(0, 8]$ olur. Tanım kümesi 0'a göre simetrik olmadığından tekliğinden ya da çiftliğinden söz edilemez.

E) g, $[5, \infty)$ üzerinde azalandır. $g(5) = 8$ ve $g(21) = 0$ olduğundan arşivdeki dosya boyutları $[0, 8]$ aralığındadır; $x = 21$ düzeyi de arşive alınır.

12. Bir sebze üretim kooperatifinde 1 dekarlık bir üretim yatağı eşit alanlı bölümlere ayrılacaktır. Bölüm sayısı ile her bölümün alanı (dekar) arasındaki ters orantılı ilişki, $f(x) = \dfrac{1}{x}$ rasyonel referans fonksiyonunun $x > 0$ kısmı ile modellenmektedir. Proje grubunun düzenlediği tablo temsili aşağıdadır.

Bölüm sayısı x	1	2	4	8	16
Bir bölümün alanı $f(x)$ (dekar)	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

Üretim planına göre bölüm sayısı 4'ten fazla olacaktır.

© 2026 Dubba · Tüm hakları saklıdır · dubba.com.tr/telif

Üretim planındaki koşul esas alındığında, f fonksiyonunun bu koşuldaki değer aralığı ile grafik temsiline yansıması **aşağıdakilerden hangisinde doğru ilişkilendirilmiştir?**

A) Fonksiyonun aldığı değerler $\left(\frac{1}{4}, \infty\right)$ aralığındadır; bağımsız değişken arttıkça bu değerler sınırsız büyür ve grafik y eksenine yaklaşır.

B) Fonksiyonun aldığı değerler $\left(-\frac{1}{4}, 0\right)$ aralığındadır; bağımsız değişken küçüldükçe bu değerler sıfıra yaklaşır ve grafik x eksenine yaklaşır.

C) Fonksiyonun aldığı değerler $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ aralığındadır; bağımsız değişken arttıkça bu değerler sıfıra yaklaşır ve grafik x eksenine yaklaşır.

D) Fonksiyonun aldığı değerler $\left(-\infty, -\frac{1}{5}\right)$ aralığındadır; bağımsız değişken 0'a yaklaştıkça bu değerler sınırsız küçülür ve grafik y eksenine yaklaşır.

E) Fonksiyonun aldığı değerler $\left(0, \frac{1}{4}\right)$ aralığındadır; bağımsız değişken arttıkça bu değerler sınırsız büyür ve grafik y eksenine yaklaşır.

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CEVAP FORMU

1	A	B	C	D	E	7	A	B	C	D	E
2	A	B	C	D	E	8	A	B	C	D	E
3	A	B	C	D	E	9	A	B	C	D	E
4	A	B	C	D	E	10	A	B	C	D	E
5	A	B	C	D	E	11	A	B	C	D	E
6	A	B	C	D	E	12	A	B	C	D	E

Cevap anahtarı ve çözümler
Karekodu okut, dubba.com.tr'ye ücretsiz üye ol; anahtar ve adım adım çözümler açılsın.

Doğru ____ Yanlış ____ Boş ____

© 2026 Dubba · Tüm hakları saklıdır · dubba.com.tr/telif

TELİF VE KULLANIM KOŞULLARI

© 2026 Dubba. Kaynak: dubba.com.tr/maarif/matematik/10-sinif/4-tema-nicelikler-ve-degisimler/yaprak-test-1. dubba.com.tr/telif

Ücretsiz TYT deneme kitapçıkları, OYSS yazılı kâğıtları ve Maarif uyumlu yaprak test soru kitapçıkları için Dubba şu ek izni verir: PDF dosyaları bütün hâlde, değiştirilmeden, bedelsiz olarak çoğaltılabilir ve öğrencilere, sınıflara, okullara ve kurslara dağıtılabilir. (Telif ve İçerik Politikası, 3.1)

Koşullar: dosya satılamaz, ücretli bir ürün ya da hizmetin parçası olarak sunulamaz; sorular, çözümler, kapak, logo, karekod ve telif notu değiştirilemez ya da çıkarılamaz; dosya başka bir sitede ya da uygulamada barındırılamaz, yalnız Dubba'daki adresine bağlantı verilir; kaynak olarak "Dubba, dubba.com.tr" gösterilir; sorular ayrıştırılıp başka materyale, soru bankasına ya da uygulamaya alınamaz; dosyalar ve sorular yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanılamaz (9.2). (Telif ve İçerik Politikası, 3.2)

Dubba İçeriği, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("Kanun") kapsamında eser olarak; MEB kazanımlarına etiketlenmiş soru havuzu ve testler bakımından ayrıca Kanun'un Ek 8. maddesindeki veri tabanı koruması kapsamında; emeğin ürününden izinsiz yararlanmaya karşı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hükümleri kapsamında korunur. Hakların tamamı Dubba ve bağlı şirketlerine (birlikte "Dubba") aittir ya da Dubba tarafından lisansla kullanılır; Dubba adına çalışan yazar ve editörlerin meydana getirdiği eserler üzerindeki mali haklar Dubba tarafından kullanılır. (Telif ve İçerik Politikası, 1.2)

Aşağıdakiler, 2-4. maddelerdeki izinler dışında yasaktır: (Telif ve İçerik Politikası, md. 10)

- Dubba İçeriği'ni kopyalamak, çoğaltmak, yayımlamak, satmak, kiralamak, dağıtmak ya da ücretli bir hizmetin parçası yapmak;
- soruları ayrıştırıp kendi soru bankasına, kitabına, uygulamasına ya da sınavına almak; soruları değiştirerek (sayıları, şıkları, ifadeyi oynayarak) kendi sorusu gibi sunmak;
- Dubba İçeriği'ni başka bir sitede barındırmak, çerçeve içine almak ya da aynalamak;
- filigran, iz kodu, telif notu ve kaynak bilgisini kaldırmak;
- Dubba'nın ad, logo ve markalarını izinsiz kullanmak, Dubba'yla ortaklık ya da onay izlenimi vermek;
- gizli ya da sızdırılmış sınav sorularını yüklemek, paylaşmak;
- üçüncü kişilerin hak sahibi olduğu içeriği izinsiz yüklemek.

Filigran, iz kodu ve telif notu, eser nüshaları üzerinde bulunan ve eser sahibini ve kullanım şartlarını gösteren bilgilerdir (Kanun Ek md. 4/1). Bu bilgiler yetkisiz olarak kaldırılamaz ve değiştirilemez; bu bilgileri kaldırılmış ya da değiştirilmiş kopyalar dağıtılamaz, yayımlanamaz ve umuma iletilemez. Kaldırılması, silinmesi ya da değiştirilmesi lisans ihlalidir ve Kanun'daki yaptırımlara tabidir. Platform'dan kopyalanan metnin sonuna eklenen kaynak ve telif satırı da aynı niteliktedir. (Telif ve İçerik Politikası, 8.2)

Politikanın tamamı: dubba.com.tr/telif